Mourisco tinto

Vass8R12s196-200



Collection Vassal-Montpellier

1489Mtp14

uluntuuluntiirdijätuuluutaul

Marriage Topo see

Mourisco tinto 8 R 12 s- 196-200





14 Mourisco tinto

RANGIL Souche 196. DESIGNATION : CLOS PLANCHE Vigueur: 85 FORT : érig - 2 éris - couché Hillerandage : O 29-7-86 Date de Véraison : 8-9-86 Date de Maturité : Pourriture 18 GRAPPE : G - N - P : L - (H) - C BAIE : TG - G - M - P20 20 disc. - (Sph). - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s13 s2 4 s34 s44 avec pépins - apyrène JUS & inc. coloré 3/2

Juntaniluati

CSOS 8 RANG 12 Souche 196-200 MASICNATION: Mourisco tinto CHARGE : Année : 28.7-9.88 varaison s Vaturité: 1411. :0 GRAPPE : G M - P - Dim.: 19 L - M - Che flus souvent vigueur : 3/5 PORT : érig - (1/2) érig - couché Année : TG -(G)- M - P - Dim.: 22 eise. -sph) -ell. -ov. -obov. -cyl. -fus. 00118UR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) m - ar - fox - herb. Avec pepins - apyrène JUS : inc. /- coloré

Nom Mawisco linto m EMPLACEMENT 8 112 196 - Low

14

Souche	Nbre yeux	Débou: début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f			raison mi/v		Maturité
3 4 5	4334/14	31.3 31.3 23.3 31.3	3.4 3.4 7.4 3.4	2 2 1 2 7	5	3.6	5.6 5.6 5,6	10.6	30:4	3,8	6.8	<b>8</b> .9 +3
4,4 -3 Port mi eng +8										rze		

NOM Mourisco tento EMPLACEMENT PR12 1 196. 200

/		p										
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4 4 5 42	5.4 1.4 5.4 5.4	8.4 5.4 8.4 8.4	3 6 7 7	13	31.5	3.6	6.0	28.7	4.8	128	12.9
	5	Pourri	ture : 4 7,4 +14	0	Port :/	mi'eng	3,6 +3	gueur	: 3,5	t2		+4

ANNEE 1989

NOM Mourisco tinto EMPLACEMENT 8 R12 s 136-200

ulantandinimilantanlantanl

1489 14

Lundondhim

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5 %	4.	163	23.3° 203° 203°.	1	5,6	24,5	275		24.7	31,7	7,8	
Pourriture: 0 Mill.: 0 Port: Mi enigé vigueur: 3,5												

ANNEE 1994

NOM Mouries to tinto EMPLACEMENT & Rg 12 1 196.200

	1				7777				
Souche	Nbre	Débourrement début mi/déb	Nbre Fe	Prof. Flo	raison mi/f   fir	Vé début	raison mi/v	fin	Maturates
2 3 4 5	5655		6 Po	cappe : G - our : Lie : TG -	Mill: G - M - P sph-ell-ov Gr-Rs-Rg-N m - ar - c - apyrên	Dim : -obov-cy Jus fox - he	Compacyl-fus : inc		

Maurisco tinto

DESIGNATION: EMPLACEMENT:

cl 8 R12 1-196-200,196)

## (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 6 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ()- en gouttière ()- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8) cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Mourisco tinto

Désignation : Emplacement : clos 8 R12 s. 196-200 (3196)

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 
  duveteux 8 cotonneux 9.

  à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 3.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

# (F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre 6 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 6 - partiellement 9.

# (I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Maurisco tento -clos 8 R 12 s - 196 - 200 (196)

Désignation :

Lundmulumb

Emplacement :

# RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

àraiestriligh. 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 1 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3) 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4. subcontinues 5 - intermittentes (6)

: coloré 7 - vert (8) 52 - bourgeon

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3)longue 4 - très longue 5.

#### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° d'ordre : Désignation : Mourisco tinto 8 R 12 s 196, 200 (3.197)

deminatantantantantant

Emplacement :

### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté -

aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 -

aranéeux 100 duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité

laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 151 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité

laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 grossièrement bullée 159 - gauffrée 160

plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166.

Face inférieure : verte 167) - partiellement rouge 168 -

entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

### PETIOLE

Long 170 - moyen (171) - court 172.

Glabre 1(73) - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 1(78).

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Mourisco tinto 8 R 12 D-196-200 (3.193) N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne 69) - Petite 70 (dimensions  $48 \times$  ). Läche 71 - Moyenne (2) - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6 A pédoncule herbacé 17 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81, BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions : 20 x 20). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91) Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration regulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoíde 99 - obovoíde 100 - cylindroíde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (1). A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122) - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127)

A pulpe charnue juteuse 1(39) - molle 140 - peu juteuse.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134)

Avec pépins - apyrène.

A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132.

A peau fine 135 - moyenne (36) - épaisse 137.

dantadantadantadadada

Maurisco tinto 8 R 12 s 196. 200 (0.5) EMPLACEMENT :

### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils

massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 11 ... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Désignation : Mourisco tinto Emplacement: 8 R 12 A 136 - 200 : (1) - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L2 : (10) - (11) L2/L : (12) - (13) -- 14 -- 15 -- 16 Nombre de lobes : (17) - (18) - (19) - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : 40 - (41) Dents : forme : (42) - (43) - 44 Dents (angle) Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L3 L'3 : 60 ~ 61 - 62 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

luntimbati